

Tamponnement intra-utérin par ballonnet Kit d'apprentissage

Le tamponnement intra-utérin par ballonnet est une intervention recommandée par L'OMS pour la prise en charge de l'hémorragie du post-partum (HPP), lorsque la compression bi-manuelle et les utérotoniques ont échoué ou ne sont pas disponibles. Le tamponnement intra-utérin réalisé en assemblant un préservatif et une sonde de Foley est à la fois abordable et généralement facilement disponible. Le dispositif est inséré dans l'utérus et gonflé avec une solution saline normale de 250–500 ml pour arrêter l'HPP. Dans de nombreux cas, le tamponnement intra-utérin par ballonnet élimine le recours à la chirurgie ou permet de gagner du temps en attendant le transfert de la patiente vers un établissement de niveau de soins supérieur.




POWERPOINT
 Présentation sur le tamponnement intra-utérin par ballonnet.




DEMONSTRATION VIDEO

Une vidéo en animation digitale de 5 minutes sur l'assemblage et l'utilisation du tamponnement intra-utérin par ballonnet

KIT D'APPRENTISSAGE
 Guide de formation pour l'apprenant et le facilitateur ; inclut des présentations PowerPoint, un outil de travail, l'évaluation des connaissances et des listes de vérification.



Liste de vérification de la documentation
 Rappelle au prestataire ce qu'il faut documenter à chaque fois qu'il a recours au tamponnement intra-utérin par ballonnet.



Liste de vérification de la performance
 Pour évaluer l'utilisation correcte du dispositif lors de la simulation et de la pratique clinique.



AIDE MEMOIRE
 Explique toutes les étapes d'utilisation du dispositif.

Disponible en anglais et en portugais

Consulter le Kit d'apprentissage, bientôt sur le site www.ReproLinePlus.org